

## **RICHIESTA DI FP-CIT I-123 (DATSCAN)**

COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_

LUOGO E DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_

PROVENIENZA \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

MEDICO REFERENTE \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

### **ORIENTAMENTO DIAGNOSTICO ATTUALE**

- MORBO DI PARKINSON IDIOPATICO
- TREMORE ESSENZIALE
- DEMENZA DA CORPI DI LEWY DIFFUSI
- DEMENZA DI ALZHEIMER
- PARALISI SOPRANUCLEARE PROGRESSIVA
- ALTRO \_\_\_\_\_

### **TEMPO DI INSORGENZA DI SEGNI E SINTOMI**

SEGNI E SINTOMI:

- BRADICINESIA
- RIGIDITÀ
- TREMORE A RIPOSO **SEDE**  ARTO SUPERIORE SINISTRO  ARTO SUPERIORE DESTRO
- ARTO INFERIORE SINISTRO  ARTO INFERIORE DESTRO
- TREMORE POSTURALE  INSTABILITÀ POSTURALE
- COESISTENZA DETERIORAMENTO COGNITIVO  SI  NO
- ALTRE PATOLOGIE CONCOMITANTI \_\_\_\_\_

Tutti i farmaci e le sostanze che si legano ai trasportatori pre-sinaptici della Dopamina **POSSONO INTERFERIRE** con la captazione striatale del DATSCAN e pertanto se ne suggerisce la sospensione, compatibilmente con le condizioni cliniche del paziente. **(v. tabella 1).**

- **È suggerito un periodo di sospensione** dell'assunzione dei farmaci interferenti **pari ad almeno 2 volte l'emivita biologica del farmaco.**

- **Nel caso in cui NON FOSSE possibile sospendere la terapia** specificare nella richiesta il tipo di farmaco, la durata della terapia e la posologia ed **apporre la dicitura “ESAME IN TERAPIA” (VEDI A PIEDE DI PAGINA).**

I farmaci anti-Parkinson (e.g. L-DOPA, dopamino-agonisti, farmaci bloccanti i recettori NMDA, inibitori delle MAO-B ed inibitori delle COMT assunti a dosaggi standard) **NON INTERFERISCONO IN MODO SIGNIFICATIVO** con il legame sui DAT e pertanto non è necessaria la loro sospensione. Attenzione però deve essere posta negli studi di follow-up intra-soggetto in relazione al possibile effetto di down-regulation sui DAT prodotto dalla L- DOPA.

**Tabella 1**

CATEGORIA FARMACO	PRINCIPIO ATTIVO	NOME COMMER.	T/2	MECCANISMO D’AZIONE
LEGANTI IL TRASPORTATORE DELLA DOPAMINA	<input type="checkbox"/> Amfetamina <input type="checkbox"/> Benzotropina <input type="checkbox"/> <b>Bupropione</b> <input type="checkbox"/> Cocaina <input type="checkbox"/> Fentermina <input type="checkbox"/> Mazindolo <input type="checkbox"/> Metilfenidato	Bupropione Sandoz Elontril Mysimba Welbutrin Zyban	1 - 50 ore	Diminuita fissazione
ANTIDEPRESSIVI: inibitori NON SELETTIVI della monoamino ricaptazione	<input type="checkbox"/> <b>Amitriptilina</b> <input type="checkbox"/> <b>Clomipramina</b> <input type="checkbox"/> Desipramina <input type="checkbox"/> Dosulepina <input type="checkbox"/> Imipramina <input type="checkbox"/> Maprotilina <input type="checkbox"/> Nortriptilina <input type="checkbox"/> Trimipramina	Laroxil Anafranil	21 – 28 gg	Diminuita fissazione
ANTIDEPRESSIVI inibitori SELETTIVI della monoamino-ricaptazione	<input type="checkbox"/> <b>Citalopram</b> <input type="checkbox"/> Escitalopram <input type="checkbox"/> <b>Fluoxetina</b> <input type="checkbox"/> <b>Fluvoxamina</b> <input type="checkbox"/> <b>Paroxetina</b> <input type="checkbox"/> <b>Sertalina</b>	Cipralex  Fluoxeren Fevarin Sereupin Zoloft	15 – 37 ore	Diminuita fissazione

**ESAME IN TERAPIA**

**TERAPIA FARMACOLOGICA** (segnalare DURATA DELLA TERAPIA E TIPO DI FARMACO )

---



---



---

Data

**MEDICO RICHIEDENTE (timbro e firma)**