Il rischio biologico e la sicurezza sul lavoro

Infortunio da rischio biologico

Evento dannoso e imprevisto in occasione di lavoro

Si verifica in ogni contatto con sangue o altre materiale biologico, derivato da puntura o ferita con aghi o altri oggetti taglienti, nonché da spruzzi su mucose o cute non integra.

D.Lgs 81 9/04/2008

È la possibilità che un agente biologico situato all'origine all'esterno dell'organismo penetri all'interno e provochi danni più o meno gravi sia nei confronti della salute dei lavoratori che della popolazione

Perchè parlare di rischio infettivo?

Uno studio del 2020 ha riportato che 1 tatuatore su 5 fra quelli intervistati (18,9%) affermava di aver riportato ferite e lacerazioni mentre svolgeva il suo lavoro MA solo 1 su 3 (35,9%) aveva ricevuto una formazione specifica sui rischi infettivi, le tecniche di disinfezione e sterilizzazione e la profilassi post-esposizione

Agenti infettivi

Sono organismi capaci di causare malattia nell'uomo e di diffondersi da uomo a uomo con diverse modalità.

Batteri

Virus

Funghi

Parassiti

La catena dell'infezione

PREVENZIONE

Patogeni a trasmissione parenterale

- ▶ **Virus dell'epatite B e dell'epatite C**: sono virus che causano infezione e danno al fegato
- ▶ **HIV** - Virus dell' immunodeficienza umana: questo virus indebolisce le difese immunitarie e può causare l'AIDS.
- ▶ **Modalità di contagio**
 - ▶ Puntura tramite ago o tagliente contaminato col sangue di persona infetta
 - ▶ Contatto del sangue con le mucose (occhio-naso-bocca)
 - ▶ Contatto sessuale

Qual è il rischio d'infezione in caso di puntura accidentale?

EPATITE B

5-30%

EPATITE C

5-10%

HIV

0,3%

Attenzione alla contaminazione indiretta !

- Le infezioni si diffondono anche tramite superfici e oggetti contaminati: una persona contamina una superficie e tramite il contatto con questa superficie altri soggetti possono infettarsi.
- Il rischio di infettarsi con questa modalità dipende dalla capacità dell'agente causale di sopravvivere all'esterno:

EPATITE B

Vitale fino a 7gg a
25°C

EPATITE C

HIV

Ridurre il rischio

- Trattare tutti i fluidi corporei, di chiunque, come potenzialmente infetti.
- Non mangiare, bere, fumare, applicare cosmetici o applicare lenti a contatto in zone dove c'è la possibilità di esposizione a patogeni a diffusione parenterale.
- Non comprimere i rifiuti nel cestino con le mani.
- Gli aghi o gli oggetti taglienti devono essere sempre riposti in un contenitore apposito. MAI piegare, rompere o richiudere gli aghi.
- Applicare le corrette regole di igiene delle mani:
 - Prima e dopo il contatto con il cliente e l'esecuzione della procedura
 - Prima di mangiare
 - Dopo aver utilizzato i servizi igienici
 - Prima di indossare dispositivi protettivi e dopo averli rimossi
- Utilizzare dispositivi di protezione come i guanti monouso quando si eseguono procedure a rischio di contaminazione.

Cosa fare in caso di incidente?

FASE 1

- ▶ **Esposizione parenterale (puntura ago - taglio)**
 - ▶ Far sanguinare la ferita per qualche istante
 - ▶ Lavare abbondantemente per 10 minuti con acqua corrente e detergente antisettico
- ▶ **Esposizione di cute non integra (screpolature - dermatite)**
 - ▶ Lavare abbondantemente con acqua corrente e detergente antisettico
 - ▶ Disinfettare con antisettico
- ▶ **Esposizione mucosa (Schizzo negli occhi naso o bocca)**
 - ▶ Lavare abbondantemente con acqua corrente, soluzione fisiologica sterile
 - ▶ Non utilizzare detergenti o antisettici

FASE 2

Accesso al Pronto Soccorso

L'infortunato dovrà recarsi immediatamente al PS più vicino per:

- Trattamento della parte esposta
- La profilassi post esposizione(vaccinazioni e/o immunoglobuline, consulenza infettivologica per eventuale trattamento antiretrovirale)
- Rilascio del primo certificato medico di infortunio e trasmissione di una copia all'INAIL

FASE 3

Consulenza presso SISP (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica)

- ▶ Controllo dello stato vaccinale ed esecuzione vaccinazione Anti-HBV e Anti-tetano
- ▶ Follow-Up: controllo dell'evoluzione dell'eventuale infezione da HBV, HCV o HIV con prelievo del sangue dopo 1, 3 e 6 mesi
- ▶ Controllo dello stato infettivo del soggetto fonte

Profilassi post-esposizione

HBV

- **Nei non vaccinati:** somministrare il prima possibile anticorpi anti-HBV (entro 7gg) + prima dose di vaccino (entro 14 gg) in due sedi differenti del corpo. Si prosegue poi alla vaccinazione accelerata (0,1,2,6-12 mesi). Efficacia del 75%.
- Nei vaccinati con avvenuta (e documentata) risposta anticorpale: nessun trattamento.

HIV

- Somministrazione di 3 farmaci antiretrovirali per 28gg

Consigli per un tatuaggio sicuro

- Usare barriere come guanti monouso e adottare una corretta igiene delle mani prima, durante e dopo le procedure
- Pulire adeguatamente la pelle con una soluzione antibatterica
- Tutti i materiali applicati alla pelle devono essere monouso o trasferiti in contenitori monouso prima dell'utilizzo.
- Utilizzare aghi usa e getta e seguire le pratiche di sicurezza durante la procedura
- Mantenere un ambiente pulito utilizzando detergenti per rimuovere sporco, sangue o altri materiali potenzialmente infetti
- Gli strumenti riutilizzabili devono essere adeguatamente puliti e sterilizzati
- Tra un cliente e l'altro tutte le superfici devono essere attentamente pulite e disinfettate
- Tutti gli strumenti che devono essere gettati e sono entrati in contatto con i fluidi corporei devono essere gettati nell'apposito contenitore.

References

- Gębska-Kuczerowska A, et al. Assessing Infection Risks among Clients and Staff Who Use Tattooing Services in Poland: An Observational Study. *Int J Environ Res Public Health*. 2020
- MT Health standard Directorare, BASIC INFORMATION IN INFECTION CONTROL FOR TATTOOISTS AND BODY PIERCERS, 2018
- EDQM, Safer tattooing: Overview of current knowledge and challenges of toxicological assessment, 2017
- Cohen PR. Tattoo-Associated Viral Infections: A Review. *Clin Cosmet Investig Dermatol*. 2021 Oct
- Serup J. Tattoo Infections, Personal Resistance, and Contagious Exposure through Tattooing. *Curr Probl Dermatol*. 2017.
- Sattar SA, Tetro J, Springthorpe VS, Giulivi A. Preventing the spread of hepatitis B and C viruses: where are germicides relevant? *Am J Infect Control*. 2001.
- Alberta Health and Wellness, Health Guidelines for tattooing, 2017.
- Jafari, S., Buxton, J.A., Afshar, K. *et al.* Tattooing and Risk of Hepatitis B: A Systematic Review and Meta-analysis. *Can J Public Health* **103**, 207–212 (2012).