



## Promemoria: **Pertosse e gravidanza**



### **La vaccinazione contro la pertosse**

***La scelta migliore in  
gravidanza per il tuo  
bambino***

### **Mamma, tu sei l'unica che può proteggere, prima della nascita, il tuo bambino dalla pertosse**

La Pertosse nei primi mesi di vita è una malattia grave e a volte mortale. Purtroppo il vaccino per prevenirla può essere somministrato solo dopo il 2° mese di vita. La buona notizia è che puoi evitare questa lacuna nella protezione facendo il vaccino (detto dTpa , perché protegge contro la pertosse ma anche contro tetano e difterite) nel terzo trimestre di gravidanza. Vaccinandoti passi gli anticorpi al tuo bambino così quando nasce è protetto contro la Pertosse.

## **Perché devo fare un vaccino contro la pertosse mentre sono incinta?**

Il vaccino contro la pertosse è raccomandato durante il terzo trimestre (27esima-36esima settimana di gravidanza) in modo che il tuo corpo possa creare anticorpi e passarli al tuo bambino prima della nascita. Questi anticorpi sono in grado di proteggere il neonato subito dopo la nascita e fino a quando il bambino inizierà il ciclo del vaccino contro la pertosse.

## **Questo vaccino è sicuro per me e per il mio bambino?**

Sì. Il vaccino contro la pertosse (dTpa) è molto sicuro per te e il tuo bambino. Gli effetti collaterali più comuni sono lievi, come arrossamento, gonfiore o dolore nel braccio dove viene fatto il vaccino. Questi sintomi vanno via in pochi giorni.

I medici e le ostetriche concordano sul fatto che il vaccino contro la pertosse è sicuro ed è importante farlo durante il terzo trimestre di ogni gravidanza.

Fare il vaccino durante la gravidanza non aumenta il rischio di complicanze come basso peso neonatale o parto prematuro.

## **Come può il mio bambino essere esposto alla pertosse?**

La pertosse si diffonde da persona a persona quando si tossisce o starnutisce o quando si sta molto tempo vicini l'un all'altro, come quando si tiene il neonato in braccio. Alcune persone con la pertosse possono avere solo una tosse lieve o quello che sembra un comune raffreddore. Poichè i sintomi, soprattutto negli adulti, possono essere molto lievi, le persone che entrano in stretto contatto con il tuo bambino possono non sapere di avere la pertosse e possono contagiarlo.

Tratto da: