

# CHECK-LIST (SCHEDA PRESCRITTIVA) TC CARDIACA

## DATI PAZIENTE

- Cognome: \_\_\_\_\_
- Nome: \_\_\_\_\_
- Data nascita: \_\_\_\_\_
- Sesso:  M  F
- Peso: \_\_\_\_\_ kg
- Altezza: \_\_\_\_\_ cm
- BMI: \_\_\_\_\_
- Telefono (se ambulatoriale): \_\_\_\_\_

## DATI ANAMNESTICI

- Fattori di rischio:
  - Ipertensione
  - Dislipidemia
  - Diabete
  - Fumo
  - Familiarità
  - Altro (da non considerare, tuttavia, nel calcolo del Risk Score successivo):  
\_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_
- **REFERTI PERTINENTI** (da allegare obbligatoriamente, se paziente ambulatoriale):
  - ECG
  - Ecocardiogramma
  - STRESS Eco
  - Test Ergometrico
  - Scintigrafia
- Creatinina: \_\_\_\_\_ (mg/dL)
- VFG (eGFR/CKD-EPI): \_\_\_\_\_ mL/min/1.73m<sup>2</sup>  Data: \_\_\_\_\_
- Terapia in atto:
  - Antiaggregante
  - Anticoagulante
  - Statina
  - Altro: \_\_\_\_\_

# CHECK-LIST (SCHEDA PRESCRITTIVA) TC CARDIACA




Fig 1 Caratteristiche dei sintomi

## CRITERI DI APPROPRIATEZZA

- Paziente sintomatico per **dolore oppressivo da sforzo con remissione con il riposo (Fig 1)**

# CHECK-LIST (SCHEDA PRESCRITTIVA) TC CARDIACA


- **Non eseguita coronarografia** in precedenza
- **Eseguita coronarografia** in precedenza (allegare documento)
- **Età al momento della richiesta:**
  - Maschio < **70 anni**
  - Femmina < **75 anni**
- Probabilità Clinica Ponderata per i Fattori di Rischio (**risk factor clinical likelihood RF-CL**) **15–50%** (secondo attuali linee guida ESC, vedi figura 2)

### Score dei sintomi (0-3 punti)

Caratteristiche del dolore toracico		Score dei sintomi
Tipo e localizzazione	Dolore costrittivo retrosternale o al collo, mandibola, spalla o braccio (1 punto)	
Accentuato da	Stress fisico o emotivo (1 punto)	
Ridotto da	Riposo o nitrati entro 5 minuti (1 punto)	
Caratteristiche della dispnea		Sintomo principale:  Dolore toracico (0-3 punti)  o  Dispnea (2 punti)
Mancanza di fiato o difficoltà a respirare aggravato dall'esercizio fisico (2 punti)		
Numero di fattori di rischio per CAD (0-5): familiarità, fumo, dislipidemia, ipertensione e diabete		
Probabilità clinica di CAD ostruttiva ponderata per i fattori di rischio (Risk factor-weighted Clinical Likelihood: RF-CL)		

Score dei sintomi	0-1						2						3					
	donne			uomini			donne			uomini			donne			uomini		
N° fattori di rischio	0-1	2-3	4-5	0-1	2-3	4-5	0-1	2-3	4-5	0-1	2-3	4-5	0-1	2-3	4-5	0-1	2-3	4-5
età 30-39	0	1	2	1	2	5	0	1	3	2	4	8	2	5	10	9	14	22
età 40-49	1	1	3	2	4	8	1	2	5	3	6	12	4	7	12	14	20	27
età 50-59	1	2	5	4	7	12	2	3	7	6	11	17	6	10	15	21	27	33
età 60-69	2	4	7	8	12	17	3	6	11	12	17	25	10	14	19	32	35	39
età 70-75	4	7	11	15	19	24	6	10	16	22	27	34	16	19	23	44	44	45
<b>(5-14%) Non Indicata coronario - TC, se non dopo aver escluso altre cause non cardiache e persistenza di sintomi</b>																		
<b>(15-50%) Indicata coronario - TC</b>																		

Fig. 2 Score dei sintomi



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Dipartimento Diagnostica per Immagini  
Dipartimenti Emergenza Cardiologico  
Internistico

# CHECK-LIST (SCHEDA PRESCRITTIVA) TC CARDIACA

Rev. 00  
del 06/02/2026  
**Allegato 1 al DOC XX**  
Pagina 4 di 4

## DATI RICHIEDENTE

- Medico richiedente: \_\_\_\_\_
  
- Firma/Timbro: \_\_\_\_\_
  
- U.O. richiedente: \_\_\_\_\_